

別表（契約単価）

番号	項目名称	項目名称(新)	検査法	基準値：男性	基準値：女性	基準値：不明	単位	所要日数	年間予定数量（件）
1	アルドラーゼ	アルドラーゼ	UV法	2. 7—5. 9	2. 7—5. 9	2. 7—5. 9	IU/L	1～2	41
2	マグネシウム	マグネシウム	酵素法	1. 9—2. 5	1. 9—2. 5	1. 9—2. 5	mg/dL	1～2	48
3	血清銅	血清銅	比色法	70—132	70—132	70—132	μg/dL	1～2	31
4	LD(LDH)－アイソザイム	LD(LDH)－アイソザイム	アガロースゲル電気泳動法	案内確認	案内確認	案内確認	%	2～3	7
5	アデニンデアミナーゼ・穿刺液	アデニンデアミナーゼ・穿刺液	酵素法				U/L	2～3	13
6	CKアイソザイム	CKアイソザイム	アガロースゲル電気泳動法	BB0～2 MB0～3 MM96～100	BB0～2 MB0～3 MM96～100	BB0～2 MB0～3 MM96～100	%	2～3	7
7	抗血小板抗体	抗血小板抗体	MPHA	(－)	(－)	(－)	0	3～5	1
8	血清補体価(CH50)	血清補体価(CH50)	Mayer変法	30—46	30—46	30—46	CH50/mL	2～3	109
9	ハプトグロビン型判定あり	ハプトグロビン型判定あり	TIA/清層アガロースゲル電気泳動法	1-1型 43～180 2-1型 38～179 2-2型 15～116	1-1型 43～180 2-1型 38～179 2-2型 15～116	1-1型 43～180 2-1型 38～179 2-2型 15～116	μg/dL	4～5	10
10	セルロプラスミン	セルロプラスミン	ネフロトリー	21—37	21—37	21—37	mg/dL	2～3	5
11	トランスフェリン	トランスフェリン	TIA	190—320	190—320	190—320	mg/dL	1～2	25
12	C3	C3	TIA	65—135	65—135	65—135	mg/dL	1～2	95
13	C4	C4	TIA	13—35	13—35	13—35	mg/dL	1～2	86
14	免疫電気泳動(M蛋白同定)	免疫電気泳動(M蛋白同定)	免疫固定電気泳動	検出せず	検出せず	検出せず		3～5	92
15	不規則性抗体	不規則性抗体	カラム凝集法(クームス法、酵素法)	(－)	(－)	(－)		2～3	4
16	水痘帯状ヘルペス：CF	水痘帯状ヘルペス：CF	CF	4 未満	4 未満	4 未満	倍	3～5	2
17	サイトメガロ：CF	サイトメガロ：CF	CF	4 未満	4 未満	4 未満	倍	3～5	1
18	総胆汁酸	総胆汁酸	酵素法	10. 0 以下	10. 0 以下	10. 0 以下	μmol/L	1～2	7
19	風疹：HI	風疹：HI	HI	8 未満	8 未満	8 未満	倍	3～4	64
20	免疫電気泳動(BJP同定)	免疫電気泳動(BJP同定)	免疫固定電気泳動	検出せず	検出せず	検出せず		3～5	36
21	ASO定量	ASO定量	LA(ラテックス凝集比濁法)	200 以下	200 以下	200 以下	IU/mL	1～2	38
22	EBV－VCA－IgG	EBV－VCA－IgG	FAT(間接蛍光抗体法)	10 未満	10 未満	10 未満	倍	3～4	86
23	抗平滑筋抗体	抗平滑筋抗体	FAT	20 未満	20 未満	20 未満	倍	2～4	1
24	抗ミトコンドリア抗体	抗ミトコンドリア抗体	間接蛍光抗体法	20 未満	20 未満	20 未満	倍	2～4	5
25	単純ヘルペス1型：NT	単純ヘルペス1型：NT	NT	4 未満	4 未満	4 未満	倍	10～15	2
26	ムンプス：HI	ムンプス：HI	HI	4 未満	4 未満	4 未満	倍	3～5	2
27	単純ヘルペス2型：NT	単純ヘルペス2型：NT	NT	4 未満	4 未満	4 未満	倍	10～15	2
28	EBV－VCA－IgM	EBV－VCA－IgM	FAT(間接蛍光抗体法)	10 未満	10 未満	10 未満	倍	3～4	85
29	EBV－VCA－IgA	EBV－VCA－IgA	FAT(間接蛍光抗体法)	10 未満	10 未満	10 未満	倍	3～4	5
30	EBV－EADR－IgG	EBV－EADR－IgG	FAT(間接蛍光抗体法)	10 未満	10 未満	10 未満	倍	3～4	11
31	EBV－EBNA	EBV－EBNA	FAT(間接蛍光抗体法)	10 未満	10 未満	10 未満	倍	3～4	74
32	7染色体(7モノソミー、7q31欠失)	7染色体(7モノソミー、7q31欠失)	FISH法					5～7	1
33	浸透圧・血清	浸透圧・血清	氷点降下法	275—290	275—290	275—290	mOsm/kg	2～3	8
34	浸透圧・尿	浸透圧・尿	氷点降下法	50—1300	50—1300	50—1300	mOsm/kg	2～3	14
35	リチウム・原子吸光法	リチウム・原子吸光法	原子吸光法	0. 3—1. 2	0. 3—1. 2	0. 3—1. 2	mEq/L	2～3	4
36	第8因子活性	第8因子活性	APTT法	62—145	62—145	62—145	%	2～5	4
37	第9因子活性	第9因子活性	APTT法	74—149	74—149	74—149	%	2～5	4
38	風疹IgG：EIA	風疹IgG：EIA	EIA	2.0未満	2.0未満	2.0未満		3～5	29
39	風疹IgM：EIA	風疹IgM：EIA	EIA	0.80未満	0.80未満	0.80未満		3～5	17
40	NAG	NAG	人工基質MPT法	11. 5 以下	11. 5 以下	11. 5 以下	U/L	2～3	95
41	1α、25-(OH)2ビタミンD	1α、25-(OH)2ビタミンD	RIA(二抗体法)	20—60	20—60	20—60	pg/mL	3～6	1
42	プロラクチン・前	プロラクチン・前	CLIA	3. 58—12. 78	6. 12—30. 54		ng/mL	2～3	7
43	カテコールアミン3分画	カテコールアミン3分画	HPLC	案内確認	案内確認	案内確認	ng/mL	3～4	43
44	CA125	CA125	CLIA	35. 0 以下	35. 0 以下	35. 0 以下	U/mL	2～3	23
45	アンジオテンシン1転換酵素	アンジオテンシン1転換酵素	笠原法	7. 7—29. 4	7. 7—29. 4	7. 7—29. 4	IU/L	1～2	18
46	DHEA－S	DHEA－S	CLEIA	案内確認	案内確認	案内確認	μg/dL	2～3	1
47	テストステロン	テストステロン	CLIA	1. 92—8. 84	案内確認	案内確認	ng/mL	2～3	5
48	Cペプチド・尿	Cペプチド・尿	CLIA	20. 1—155	20. 1—155	20. 1—155	μg/day	2～3	3
49	PTH－インタクト	PTH－インタクト	ECLIA法	10—65	10—65	10—65	pg/mL	2～3	5
50	第8因子様抗原(VW因子抗原定量)	第8因子様抗原(VW因子抗原定量)	LA(ラテックス凝集比濁法)	50— 150	50— 150	50— 150	%	2～5	2
51	プロテインC活性	プロテインC活性	合成基質法	64—135	64—135	64—135	%	2～3	4
52	ミオグロビン・尿	ミオグロビン・尿	RIA(二抗体法)	10 以下	10 以下	10 以下	ng/mL	2～4	2
53	プレアルブミン	プレアルブミン	TIA	22—40	22—40	22—40	mg/dL	2～3	37
54	レチノール結合蛋白	レチノール結合蛋白	LA(ラテックス凝集比濁法)	2. 7—6. 0	1. 9—4. 6		mg/dL	2～3	14
55	SCC抗原	SCC抗原	CLIA	1. 5 以下	1. 5 以下	1. 5 以下	ng/mL	2～3	33
56	ケトン体分画・静脈血	ケトン体分画・静脈血	酵素法	案内確認	案内確認	案内確認	μmol/L	2～3	4
57	NSE	NSE	ECLIA法	16. 3 以下	16. 3 以下	16. 3 以下	ng/mL	2～3	20
58	CA15－3	CA15－3	CLIA	31. 3 以下	31. 3 以下	31. 3 以下	U/mL	2～3	10
59	インスリン	インスリン	CLIA	1. 7—10. 4	1. 7—10. 4	1. 7—10. 4	μU/mL	2～3	14
60	筋炎関連抗体セット	筋炎関連抗体セット	LBA	L3分画 10.0未満	L3分画 10.0未満	L3分画 10.0未満		2～3	6
61	病理特殊染色標本作製A1枚	病理特殊染色標本作製A1枚							1
62	病理特殊染色標本作製B1枚	病理特殊染色標本作製B1枚							2
63	エラストーゼ1	エラストーゼ1	LA(ラテックス凝集比濁法)	300 以下	300 以下	300 以下	ng/dL	1～2	2
64	第2因子活性	第2因子活性	PT法	74—146	74—146	74—146	%	2～5	4
65	アミノ酸分画	アミノ酸分画	HPLC	案内確認	案内確認	案内確認		4～5	10
66	細胞診	細胞診						5～6	2
67	抗カルジオリビン抗体IgG	抗カルジオリビン抗体IgG	EIA	10. 0 未満	10. 0 未満	10. 0 未満	U/mL	3～6	11
68	乳酸	乳酸	酵素法	3. 7—16. 3	3. 7—16. 3	3. 7—16. 3	mg/dL	2～3	23
69	ビルビン酸	ビルビン酸	酵素法	0. 30—0. 90	0. 30—0. 90	0. 30—0. 90	mg/dL	2～3	19
70	リパーゼ	リパーゼ	酵素法	5—35	5—35	5—35	U/L	1～2	13
71	ビタミンB2	ビタミンB2	HPLC	12. 8—27. 6	12. 8—27. 6	12. 8—27. 6	μg/dL	3～4	1
72	ビタミンB12	ビタミンB12	CLIA	233—914	233—914	233—914	pg/mL	2～3	59
73	葉酸	葉酸	CLIA	3. 6—12. 9	3. 6—12. 9	3. 6—12. 9	ng/mL	2～3	58
74	ニトラゼパム	ニトラゼパム	LC-MS/MS	20—100	20—100	20—100	ng/mL	3～4	4
75	クロナゼパム	クロナゼパム	LC-MS/MS	10—70	10—70	10—70	ng/mL	3～4	17
76	ジゴキシン	ジゴキシン	EIA	0. 5—1. 5	0. 5—1. 5	0. 5—1. 5	ng/mL	2～3	17
77	リドカイン	リドカイン	EMIT	1. 5—5	1. 5—5	1. 5—5	μg/mL	2～3	3
78	尿中銅	尿中銅	原子吸光法	18 以下	18 以下	18 以下	μg/L	3～6	2
79	亜鉛	亜鉛	原子吸光法	80—130	80—130	80—130	μg/dL	2～3	57
80	亜鉛・尿	亜鉛・尿	原子吸光法	64—947	64—947	64—947	μg/L	3～6	2
81	PIVKA－2：CLIA	PIVKA－2：CLIA	CLIA	40 未満	40 未満	40 未満	mAU/mL	2～3	33
82	第5因子活性	第5因子活性	PT法	70—152	70—152	70—152	%	2～5	3
83	第7因子活性	第7因子活性	PT法	63—143	63—143	63—143	%	2～5	2
84	第10因子活性	第10因子活性	PT法	71—128	71—128	71—128	%	2～5	3
85	第11因子活性	第11因子活性	APTT法	73—136	73—136	73—136	%	2～5	2
86	第12因子活性	第12因子活性	APTT法	46—156	46—156	46—156	%	2～5	2
87	第13因子定量	第13因子定量	LA(ラテックス凝集比濁法)	70 以上	70 以上	70 以上	%	2～5	46
88	テイコプラニン	テイコプラニン	LA(ラテックス凝集比濁法)	案内確認	案内確認	案内確認	μg/mL	2～3	1
89	IgE(RAST)	IgE(RAST)	FEIA	0.35未満	0.35未満	0.35未満	UA/mL	2～3	928
90	IgE(RIST)	IgE(RIST)	FEIA	170 以下	170 以下	170 以下	IU/mL	2～3	446
91	抗DNA抗体：RIA	抗DNA抗体：RIA	RIA(塩安塩析法)	6 以下	6 以下	6 以下	IU/mL	2～3	29
92	抗胃壁抗体	抗胃壁抗体	FAT(蛍光抗体法)	10 未満	10 未満	10 未満	倍	4～6	2
93	ミオグロビン	ミオグロビン	CLIA	154. 9 以下	106. 0 以下		ng/mL	2～3	4
94	第8因子インヒビター	第8因子インヒビター	ヘキサ法	検出せず	検出せず	検出せず	BU/mL	2～5	2
95	第9因子インヒビター	第9因子インヒビター	ヘキサ法	検出せず	検出せず	検出せず	BU/mL	2～5	1
96	抗CCP抗体	抗CCP抗体	CLIA	4. 5 未満	4. 5 未満	4. 5 未満	U/mL	2～3	47

番号	項目名称	項目名称(新)	検査法	基準値：男性	基準値：女性	基準値：不明	単位	所要日数	年間予定数量 (件)
97	インスリン抗体	インスリン抗体	RIA	案内確認	案内確認	案内確認		3~6	1
98	MLA45CDa * CDb	MLA45CDa * CDb						2~3	3
99	MLA45CDc * CDd	MLA45CDc * CDd						2~3	3
100	HBe抗原:CLIA	HBe抗原:CLIA	CLIA	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)		2~3	6
101	HBe抗体:CLIA	HBe抗体:CLIA	CLIA	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)		2~3	6
102	IgM-HBc抗体	IgM-HBc抗体	CLIA	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)		2~3	4
103	パルボウイルスB19IgM抗体	パルボウイルスB19IgM抗体	EIA	陰性(-)Index0.80未満	陰性(-)Index0.80未満	陰性(-)Index0.80未満		3~9	14
104	MLA45CDe * Cdf	MLA45CDe * Cdf	0					2~3	3
105	MLA45CDg * CDh	MLA45CDg * CDh	0					2~3	2
106	オリゴクローナルバンド:IEF	オリゴクローナルバンド:IEF	等電点電気泳動法	陰性:陰性バンド数0~1	陰性:陰性バンド数0~1	陰性:陰性バンド数0~1		5~8	8
107	TRACP-5b	TRACP-5b	EIA	170-590	120-420		mU/dL	2~3	1
108	サリチル酸(アスピリン)	サリチル酸(アスピリン)	酵素法	150-300	150-300	150-300	μg/mL	2~3	4
109	DUPAN-2	DUPAN-2	EIA	150 以下	150 以下	150 以下	U/mL	3~5	2
110	アスベルギルス抗原:EIA	アスベルギルス抗原:EIA	EIA	陰性(-)COI0.5未満	陰性(-)COI0.5未満	陰性(-)COI0.5未満		2~4	44
111	LH	LH	CLIA	0.79-5.72	案内確認		mIU/mL	2~3	8
112	FSH	FSH	CLIA	2.00-8.30	案内確認		mIU/mL	2~3	8
113	Cペプチド	Cペプチド	CLIA	0.6-1.8	0.6-1.8	0.6-1.8	ng/mL	2~3	33
114	コルチゾール	コルチゾール	CLIA	3.7-19.4	3.7-19.4	3.7-19.4	μg/dL	2~3	61
115	ACTH	ACTH	ECLIA法	7.2-63.3	7.2-63.3	7.2-63.3	pg/mL	2~3	20
116	CD45CDa * CDb	CD45CDa * CDb						2~3	1
117	CD45CDc * CDd	CD45CDc * CDd						2~3	1
118	CD45CDe * Cdf	CD45CDe * Cdf						2~3	1
119	CD45CDg * CDh	CD45CDg * CDh						2~3	1
120	CD45CDi * CDj	CD45CDi * CDj						2~3	1
121	単純ヘルペスIgG	単純ヘルペスIgG	EIA	陰性(-) EIA価血清:2.0未満 髄液:0.20未満	陰性(-) EIA価血清:2.0未満 髄液:0.20未満	陰性(-) EIA価血清:2.0未満 髄液:0.20未満		3~5	19
122	単純ヘルペスIgM	単純ヘルペスIgM	EIA	陰性(-) INDEX値 0.80未満	陰性(-) INDEX値 0.80未満	陰性(-) INDEX値 0.80未満		3~5	19
123	水痘帯状ヘルペスIgG:EIA	水痘帯状ヘルペスIgG:EIA	EIA	陰性(-) EIA価 2.0未満	陰性(-) EIA価 2.0未満	陰性(-) EIA価 2.0未満		3~5	41
124	水痘帯状ヘルペスIgM:EIA	水痘帯状ヘルペスIgM:EIA	EIA	陰性(-) INDEX値 0.80未満	陰性(-) INDEX値 0.80未満	陰性(-) INDEX値 0.80未満		3~5	9
125	麻疹IgG:EIA	麻疹IgG:EIA	EIA	陰性(-) EIA価 2.0未満	陰性(-) EIA価 2.0未満	陰性(-) EIA価 2.0未満		3~5	52
126	麻疹IgM:EIA	麻疹IgM:EIA	EIA	陰性(-) INDEX値 0.80未満	陰性(-) INDEX値 0.80未満	陰性(-) INDEX値 0.80未満		3~5	22
127	ムンプスIgG:EIA	ムンプスIgG:EIA	EIA	陰性(-) EIA価 2.0未満	陰性(-) EIA価 2.0未満	陰性(-) EIA価 2.0未満		3~5	39
128	ムンプスIgM:EIA	ムンプスIgM:EIA	EIA	陰性(-) INDEX値 0.80未満	陰性(-) INDEX値 0.80未満	陰性(-) INDEX値 0.80未満		3~5	11
129	MLA45CDi * CDj	MLA45CDi * CDj	0					2~3	1
130	CD45CDk * CDl	CD45CDk * CDl	0					2~3	1
131	MLA45CDk * CDl	MLA45CDk * CDl	0					2~3	1
132	悪性リンパ腫解析/CD45	悪性リンパ腫解析/CD45	フローサイトメリー法					2~3	15
133	リウマチ因子定量	リウマチ因子定量	LA(ラテックス凝集比濁法)	15 以下	15 以下	15 以下	IU/mL	1~2	35
134	α2PI-ブラスミン複合体	α2PI-ブラスミン複合体	LPiA	0.8 未満	0.8 未満	0.8 未満	μg/mL	2~3	3
135	ツツガムヒート-IgM:FA法	ツツガムヒート-IgM:FA法	FA	10 未満	10 未満	10 未満	倍	5~8	1
136	CA72-4	CA72-4	ECLIA法	8.0 以下	8.0 以下	8.0 以下	U/mL	2~3	2
137	ガストリン	ガストリン	RIA(PEG法)	37-172	37-172	37-172	pg/mL	2~5	8
138	ジアゼパム	ジアゼパム	LC-MS/MS	有効治療濃度200~500 中毒域1000以上	有効治療濃度200~500 中毒域1000以上	有効治療濃度200~500 中毒域1000以上	ng/mL	3~5	4
139	SPan-1	SPan-1	IRMA(ビーズ固相法)	30 以下	30 以下	30 以下	U/mL	2~5	1
140	KMT2A(11q23転座)	KMT2A(11q23転座)	FISH法					5~7	1
141	ゾニサミド	ゾニサミド	ラテックス凝集法	案内確認	案内確認	案内確認	μg/mL	2~3	64
142	クロバザム(デスメチルクロバザム)	クロバザム(デスメチルクロバザム)	LC-MS/MS	トラフ クロバザム30~300 デスメチルクロバザム300~3000	トラフ クロバザム30~300 デスメチルクロバザム300~3000	トラフ クロバザム30~300 デスメチルクロバザム300~3000	ng/mL	3~4	72
143	PA-IgG	PA-IgG	EIA	30.2 以下	30.2 以下	30.2 以下	ng/10*7・PL	2~3	5
144	トロンビンAT複合体	トロンビンAT複合体	CLEIA	3.0 未満	3.0 未満	3.0 未満	ng/mL	2~3	4
145	ビタミンC	ビタミンC	HPLC	5.5-16.8	5.5-16.8	5.5-16.8	μg/mL	5~7	1
146	鉄染色-マルク	鉄染色-マルク	ヘルリブル					2~4	11
147	可溶性フィブリノモノマー複合体定量	可溶性フィブリノモノマー複合体定量	LA(ラテックス凝集比濁法)	6.1 以下	6.1 以下	6.1 以下	μg/mL	2~5	2
148	クレンジアトロマチスIgA&IgG	クレンジアトロマチスIgA&IgG	EIA	陰性(-)COI0.900未満	陰性(-)COI0.900未満	陰性(-)COI0.900未満		3~5	4
149	抗トリコスポロン・アサヒ抗体	抗トリコスポロン・アサヒ抗体	ELISA法(Antigen-Captured ELISA)	陰性:0.15CAI未満	陰性:0.15CAI未満	陰性:0.15CAI未満		8~15	2
150	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸	LA(ラテックス凝集比濁法)	50.0 以下	50.0 以下	50.0 以下	ng/mL	1~2	3
151	アミノ酸分画・尿	アミノ酸分画・尿	HPLC	案内確認	案内確認	案内確認		4~5	1
152	ヒアルロン酸・その他	ヒアルロン酸・その他	ラテックス凝集法				ng/mL	1~2	2
153	エストロキシミド:EIA	エストロキシミド:EIA	EIA	40-100	40-100	40-100	μg/mL	2~3	26
154	HIV抗原・抗体(スクリーニング)	HIV抗原・抗体(スクリーニング)	CLIA	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)		2~3	41
155	リウマチ因子-IgG	リウマチ因子-IgG	EIA	IgG RF Index 2.0未満	IgG RF Index 2.0未満	IgG RF Index 2.0未満		3~5	45
156	シクロスポリン・血液	シクロスポリン・血液	ECLIA				ng/mL	2~3	45
157	ジストロフィン遺伝子解析	ジストロフィン遺伝子解析	MLPA法					8~21	4
158	エンドトキシン定量:ES	エンドトキシン定量:ES	比濁時間分析法	5.0 未満	5.0 未満	5.0 未満	pg/mL	2~3	2
159	多発性骨髄腫解析/CD38	多発性骨髄腫解析/CD38	フローサイトメリー法					2~3	8
160	フォン・ウィルブラント因子	フォン・ウィルブラント因子	固定血小板凝集法	50-150	50-150	50-150	%	2~5	3
161	サイトメガロウイルス-DNA定量	サイトメガロウイルス-DNA定量	リアルタイムPCR法	100 未満	100 未満	100 未満	コピー/mL	2~4	1
162	ニューモシステスカリニ:PCR	ニューモシステスカリニ:PCR	PCR法	検出せず	検出せず	検出せず		5~7	1
163	単純ヘルペスウイルス-DNA定量	単純ヘルペスウイルス-DNA定量	リアルタイムPCR法	100 未満	100 未満	100 未満	コピー/mL	2~4	9
164	尿中トランスフェリン	尿中トランスフェリン	LA(ラテックス凝集比濁法)	1.0以下	1.0以下	1.0以下	mg/gcr	2~3	7
165	抗カルジオリピンβ2GP1複合体抗体	抗カルジオリピンβ2GP1複合体抗体	EIA	3.5 以下	3.5 以下	3.5 以下	U/mL	2~4	2
166	抗アセチルコリンレセプター結合抗体	抗アセチルコリンレセプター結合抗体	RIA(抗HtgG法)	陰性(-)0.2以下	陰性(-)0.2以下	陰性(-)0.2以下	nmol/L	3~6	5
167	HCV-RNA(検診)	HCV-RNA(検診)	リアルタイムRT-PCR法	陰性	陰性	陰性		4~5	1
168	TARC	TARC	CLEIA	案内確認	案内確認	案内確認	pg/mL	2~3	13
169	染色体検査:マルチカラー-FISH法	染色体検査:マルチカラー-FISH法	FISH法					21~28	1
170	ヘリコバクター・ピロリ抗体	ヘリコバクター・ピロリ抗体	LA(ラテックス凝集比濁法)	陰性(-)(10U/mL未満)	陰性(-)(10U/mL未満)	陰性(-)(10U/mL未満)		1~2	28
171	シフラ	シフラ	CLIA	3.5 以下	3.5 以下	3.5 以下	ng/mL	2~3	115
172	グリコアルブミン	グリコアルブミン	酵素法	12.3-16.5	12.3-16.5	12.3-16.5	%	1~2	10
173	クリプトコッカスネオフォルマンズ抗原	クリプトコッカスネオフォルマンズ抗原	逆受身ラテックス凝集反応	(-)	(-)	(-)		3~6	12
174	サイトメガロ:アンチゲネミア	サイトメガロ:アンチゲネミア	間接酵素抗体法(アンチジェネミア法)	判定(-)	判定(-)	判定(-)		2~3	31
175	MAC同定:TaqManPCR	MAC同定:TaqManPCR	リアルタイムPCR法	検出せず	検出せず	検出せず		2~3	20
176	BCR-ABL1(9:22転座)	BCR-ABL1(9:22転座)	FISH法					5~7	1
177	クラミジアT:TaqManPCR	クラミジアT:TaqManPCR	リアルタイムPCR法	検出せず	検出せず	検出せず		2~3	1
178	骨型アルカリフォスファターゼ	骨型アルカリフォスファターゼ	CLEIA	3.7-20.9	案内確認		μg/L	2~3	1
179	サイログロブリン	サイログロブリン	ECLIA法	33.7 以下	33.7 以下	33.7 以下	ng/mL	2~3	2
180	マトリックスメタプロテインナーゼ-3	マトリックスメタプロテインナーゼ-3	LA(ラテックス凝集比濁法)	36.9-121	17.3-59.7		ng/mL	1~2	17
181	MAF-IGH(14:16転座)	MAF-IGH(14:16転座)	FISH法					5~7	4
182	HCV群別(グルーピング)	HCV群別(グルーピング)	CLEIA				型	2~3	3
183	タクロリムス	タクロリムス	ECLIA	5-20	5-20	5-20	ng/mL	2~3	17
184	FGFR3-IGH(4:14転座)	FGFR3-IGH(4:14転座)	FISH法					5~7	2
185	ポリコナゾール	ポリコナゾール	LC-MS/MS	案内確認	案内確認	案内確認	μg/mL	3~5	2
186	ALPアイソザイム	ALPアイソザイム	アガロース電気泳動法	案内確認	案内確認	案内確認	%	2~3	4
187	MYC(8q24転座)	MYC(8q24転座)	FISH法					5~7	1
188	結核菌群迅速同定(結核菌群抗原)	結核菌群迅速同定(結核菌群抗原)	イムノクロマトグラフィー法					2~3	2
189	MYC-IGH(8:14転座)	MYC-IGH(8:14転座)	FISH法					5~7	1
190	好中球BCR-ABL1(9:22転座)	好中球BCR-ABL1(9:22転座)	FISH法					5~7	1
191	T細胞B細胞百分率:フローサイト	T細胞B細胞百分率:フローサイト	フローサイトメリー					2~3	3
192	ProGRP	ProGRP	CLIA	81.0 未満	81.0 未満	81.0 未満	pg/mL	2~3	95
193	リンパ球幼若化試験-1薬剤	リンパ球幼若化試験-1薬剤	3H-サイシン取込測定法	179 以下	179 以下	179 以下	%	6~7	6

番号	項目名称	項目名称(新)	検査法	基準値：男性	基準値：女性	基準値：不明	単位	所要日数	年間予定数量（件）
194	CMV-DNA定量・リンパ球	CMV-DNA定量・リンパ球	リアルタイムPCR法	10 未満	10 未満	10 未満	コピー／μg	3～5	2
195	白血病・リンパ腫解析／CD45	白血病・リンパ腫解析／CD45	フローサイトメリー法					2～3	14
196	CD4	CD4	フローサイトメリー法					2～3	7
197	CD8	CD8	フローサイトメリー法					2～3	7
198	WT1mRNA定量・血液	WT1mRNA定量・血液	リアルタイムRT-PCR法				コピー／μg RNA	3～5	66
199	ツツガ虫-ギリアムIgM:FA	ツツガ虫-ギリアムIgM:FA	FA	10 未満	10 未満	10 未満	倍	5～8	1
200	ツツガ虫-カーブIgM:FA	ツツガ虫-カーブIgM:FA	FA	10 未満	10 未満	10 未満	倍	5～8	1
201	リンパ球幼若化試験-2薬剤	リンパ球幼若化試験-2薬剤	3H-サイジン取込能測定法	179 以下	179 以下	179 以下	%	6～7	3
202	リンパ球幼若化試験-3薬剤	リンパ球幼若化試験-3薬剤	3H-サイジン取込能測定法	179 以下	179 以下	179 以下	%	6～7	1
203	リンパ球幼若化試験-5薬剤	リンパ球幼若化試験-5薬剤	3H-サイジン取込能測定法	179 以下	179 以下	179 以下	%	6～7	1
204	ループスアンチコアグラント:dRVV	ループスアンチコアグラント:dRVV	希釈ウェル蛇毒試験法	1. 3 未満	1. 3 未満	1. 3 未満	Ratio	2～3	5
205	WT1mRNA定量・骨髓液	WT1mRNA定量・骨髓液	リアルタイムRT-PCR法				コピー／μg RNA	3～5	4
206	TP53(17p13. 1欠失)	TP53(17p13. 1欠失)	FISH法					5～7	9
207	ヒト臓由来脂肪酸結合蛋白	ヒト臓由来脂肪酸結合蛋白	LA(ラテックス凝集比濁法)	5. 0 以下	5. 0 以下	5. 0 以下	ng/mL	2～8	1
208	HBc抗体:CLIA	HBc抗体:CLIA	CLIA	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)		2～3	49
209	抗内因子抗体	抗内因子抗体	CLEIA法	(-)	(-)	(-)		2～5	1
210	肺サーファクタントプロテインD	肺サーファクタントプロテインD	EIA	110 未満	110 未満	110 未満	ng/mL	3～5	1
211	CD4×CD8	CD4×CD8	フローサイトメリー法					2～3	2
212	HCVコア抗原	HCVコア抗原	CLIA	3. 0 未満	3. 0 未満	3. 0 未満	fmol/L	2～3	9
213	HCV-RNA定量:TaqMan	HCV-RNA定量:TaqMan	リアルタイムRT-PCR法	定量結果1.2未満 増幅反応シグナル:検 出せず	定量結果1.2未満 増幅反応シグナル:検 出せず	定量結果1.2未満 増幅反応シグナル:検 出せず	Log IU/mL	3～4	10
214	ミエリンベースック蛋白(MBP)	ミエリンベースック蛋白(MBP)	EIA	102 以下	102 以下	102 以下	pg/mL	3～9	2
215	梅毒定性:RPR法	梅毒定性:RPR法	LA(ラテックス凝集比濁法)	(-)	(-)	(-)		2～3	1
216	梅毒定量:RPR法	梅毒定量:RPR法	LA(ラテックス凝集比濁法)	1. 0 未満	1. 0 未満	1. 0 未満	R. U.	2～3	2
217	結核菌同定:TaqManPCR	結核菌同定:TaqManPCR	リアルタイムPCR法	検出せず	検出せず	検出せず		2～3	1
218	NT-proBNP	NT-proBNP	ECLIA法	125 以下	125 以下	125 以下	pg/mL	2～3	70
219	G/バンド分染法-骨髓異形成症候群	G/バンド分染法-骨髓異形成症候群	分染法					13～18	11
220	G/バンド分染法-骨髓増殖性疾患	G/バンド分染法-骨髓増殖性疾患	分染法					13～18	1
221	G/バンド分染法-悪性リンパ腫	G/バンド分染法-悪性リンパ腫	分染法					13～18	10
222	G/バンド分染法-多発性骨髄腫	G/バンド分染法-多発性骨髄腫	分染法					13～18	6
223	IgG-HA抗体	IgG-HA抗体	CLIA	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)		2～3	3
224	IgM-HA抗体	IgM-HA抗体	CLIA	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)		2～3	8
225	抗核抗体:FAT	抗核抗体:FAT	FAT(間接蛍光抗体法)	40倍未満	40倍未満	40倍未満		2～3	152
226	IGH遺伝子再構成:PCR法	IGH遺伝子再構成:PCR法	PCR+キャピラリー電気泳動法	再構成を認めない	再構成を認めない	再構成を認めない		8～11	13
227	TRB遺伝子再構成:PCR法	TRB遺伝子再構成:PCR法	PCR+キャピラリー電気泳動法	再構成を認めない	再構成を認めない	再構成を認めない		8～11	10
228	TRG遺伝子再構成:PCR法	TRG遺伝子再構成:PCR法	PCR+キャピラリー電気泳動法	再構成を認めない	再構成を認めない	再構成を認めない		8～11	10
229	TRD遺伝子再構成:PCR法	TRD遺伝子再構成:PCR法	PCR+キャピラリー電気泳動法	再構成を認めない	再構成を認めない	再構成を認めない		8～11	10
230	シスタチンC:LA法	シスタチンC:LA法	LA(ラテックス凝集比濁法)	0. 61—1. 00	0. 51—0. 82		mg/L	1～2	24
231	歯周病唾液検査	歯周病唾液検査	Hb1.70 μg/ml未満 LD:271U/L未満	Hb1.70 μg/ml未満 LD:271U/L未満	Hb1.70 μg/ml未満 LD:271U/L未満			2～3	44
232	C1-インアクチベーター活性	C1-インアクチベーター活性	発色性合成基質法	70—130	70—130	70—130	%	2～8	1
233	プロテインS活性	プロテインS活性	凝固時間法	64—149	64—149	64—149	%	2～5	3
234	IgG・尿	IgG・尿	TIA				mg/dL	2～3	7
235	IgGインデックス	IgGインデックス	インデックス0.73以下	インデックス0.73以下	インデックス0.73以下	インデックス0.73以下		2～3	7
236	IgGサブクラスIgG4(LA)	IgGサブクラスIgG4(LA)	LA(ラテックス凝集比濁法)	11—121	11—121	11—121	mg/dL	2～3	12
237	IgGサブクラスIgG2(TIA)	IgGサブクラスIgG2(TIA)	免疫比濁法	239—838	239—838	239—838	mg/dL	2～5	2
238	レベチラセタム	レベチラセタム	LC-MS法	案内確認	案内確認	案内確認	μg/mL	3～4	298
239	ラモトリギン	ラモトリギン	LC-MS/MS	案内確認	案内確認	案内確認	μg/mL	3～4	106
240	トビラマート	トビラマート	LC-MS/MS	案内確認	案内確認	案内確認	μg/mL	3～4	46
241	HBVジェノタイプ判定:EIA	HBVジェノタイプ判定:EIA	EIA					3～9	1
242	抗MAC抗体	抗MAC抗体	EIA	(-)0.7未満	(-)0.7未満	(-)0.7未満	U/ML	3～6	47
243	スチリパントール	スチリパントール	LC-MS/MS				μg/mL	3～5	18
244	エストラジオール	エストラジオール	CLIA	19—51	案内確認		pg/mL	2～3	8
245	HCV抗体(肝炎検診/ルミバルス)	HCV抗体(肝炎検診/ルミバルス)	CLEIA	陰性 1.0未満	陰性 1.0未満	陰性 1.0未満		2～3	1
246	ルフィナミド	ルフィナミド	LC-MS/MS				μg/mL	3～5	1
247	百日咳菌抗体:EIA	百日咳菌抗体:EIA	EIA	PT-IgG 10未満 FHA-IgG 10未満	PT-IgG 10未満 FHA-IgG 10未満	PT-IgG 10未満 FHA-IgG 10未満	EU/mL	3～5	42
248	抗BP180抗体	抗BP180抗体	CLEIA	9. 0 未満	9. 0 未満	9. 0 未満	U/mL	2～3	1
249	抗セントロメア抗体	抗セントロメア抗体	CLEIA	10. 0 未満	10. 0 未満	10. 0 未満	U/mL	2～3	2
250	抗Jo-1抗体:CLEIA	抗Jo-1抗体:CLEIA	CLEIA	10. 0 未満	10. 0 未満	10. 0 未満	U/mL	2～4	25
251	抗dsDNA抗体IgG:CLEIA	抗dsDNA抗体IgG:CLEIA	CLEIA	12. 0 以下	12. 0 以下	12. 0 以下	IU/mL	2～3	6
252	抗ssDNA抗体IgG:CLEIA	抗ssDNA抗体IgG:CLEIA	CLEIA	25. 0 以下	25. 0 以下	25. 0 以下	AU/mL	2～3	3
253	Viewアレルギー	Viewアレルギー	FEIA	Index 0.27未満	Index 0.27未満	Index 0.27未満		3～4	19
254	抗ARS抗体	抗ARS抗体	EIA	陰性(-) index25.0未満	陰性(-) index25.0未満	陰性(-) index25.0未満		3～9	22
255	TSH刺激性レセプター抗体	TSH刺激性レセプター抗体	EIA	120 以下	120 以下	120 以下	%	3～6	19
256	(1→3)-β-D-グルカン	(1→3)-β-D-グルカン	発色合成基質法	20 以下	20 以下	20 以下	pg/mL	2～3	93
257	TSHレセプター抗体定量	TSHレセプター抗体定量	ECLIA法	2. 0 未満	2. 0 未満	2. 0 未満	IU/L	2～3	24
258	GH	GH	ECLIA法	2. 47 以下	0. 13—9. 88		ng/mL	2～3	7
259	ビタミンB1	ビタミンB1	LC-MS/MS	2. 6—5. 8	2. 6—5. 8	2. 6—5. 8	μg/dL	3～4	5
260	抗GAD抗体	抗GAD抗体	EIA	5. 0 未満	5. 0 未満	5. 0 未満	U/mL	2～4	10
261	血しょうレニン活性	血しょうレニン活性	EIA	案内確認	案内確認	案内確認	ng/mL/hr	3～4	346
262	抗MDA5抗体	抗MDA5抗体	EIA	陰性 index32未満	陰性 index32未満	陰性 index32未満		2～8	1
263	エリスロペチン	エリスロペチン	CLEIA	4. 2—23. 7	4. 2—23. 7	4. 2—23. 7	mIU/mL	2～3	31
264	パゾブレシン(AVP)	パゾブレシン(AVP)	RIA(2抗体法)	案内確認	案内確認	案内確認	pg/mL	5～7	4
265	ペランパネル	ペランパネル	LC-MS/MS				ng/mL	3～4	26
266	原中L-FABP	原中L-FABP	ラテックス凝集比濁法	8.4以下	8.4以下	8.4以下	μg/gCr	2～3	1
267	ラコサミド	ラコサミド	LC-MS/MS				μg/mL	3～4	94
268	百日咳菌核酸同定	百日咳菌核酸同定	LAMP	検出せず	検出せず	検出せず		3～4	7
269	MPO-ANCA(P-ANCA)	MPO-ANCA(P-ANCA)	FEIA	陰性(-)3.5未満	陰性(-)3.5未満	陰性(-)3.5未満	IU/mL	2～3	69
270	PR3-ANCA(C-ANCA)	PR3-ANCA(C-ANCA)	FEIA	陰性(-)2.0未満	陰性(-)2.0未満	陰性(-)2.0未満	IU/mL	2～3	66
271	抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)	抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)	FEIA	陰性(-)7.0未満	陰性(-)7.0未満	陰性(-)7.0未満	U/mL	2～3	1
272	メタネフリン2分画・尿	メタネフリン2分画・尿	LC-MS/MS	案内確認	案内確認	案内確認	mg/day	3～4	1
273	パニリルマンデル酸・クレアチニン補正	パニリルマンデル酸・クレアチニン補正	LC-MS/MS	1. 2—4. 9	1. 2—4. 9	1. 2—4. 9	μg/mgCr	3～4	5
274	ホモニリルン酸クレアチニン補正	ホモニリルン酸クレアチニン補正	HPLC	1. 6—5. 5	1. 6—5. 5	1. 6—5. 5	μg/mgCr	3～4	4
275	HBV-DNA定量:TaqMan	HBV-DNA定量:TaqMan	リアルタイムPCR法	1.0未満 検出せず	1.0未満 検出せず	1.0未満 検出せず	Loog IU/mL	3～4	49
276	プレセブシン	プレセブシン	CLEIA	案内確認	案内確認	案内確認	pg/mL	2～3	147
277	便中カルプロテクチン	便中カルプロテクチン	FEIA	案内確認	案内確認	案内確認	mg/kg	4～10	37
278	カルニチン	カルニチン	酵素サイクリング法	案内確認	案内確認	案内確認	μmol/L	2～3	106
279	ADAMTS13活性	ADAMTS13活性	ELISA	0. 10以上	0. 10以上	0. 10以上	IU/mL	3～5	1
280	C. ティフィシル毒素遺伝子検出	C. ティフィシル毒素遺伝子検出	リアルタイムPCR法					2～3	1
281	サイトメガロIgG:CLIA	サイトメガロIgG:CLIA	CLIA	陰性(-)6.0未満	陰性(-)6.0未満	陰性(-)6.0未満	AU/mL	2～3	48
282	サイトメガロIgM:CLIA	サイトメガロIgM:CLIA	CLIA	陰性(-)8.5未満	陰性(-)8.5未満	陰性(-)8.5未満		2～3	51
283	トキソプラズマ抗体IgM:CLIA	トキソプラズマ抗体IgM:CLIA	CLIA	陰性(-)0.83未満	陰性(-)0.83未満	陰性(-)0.83未満		2～3	1
284	ソマトメジン-C(IGF-1)	ソマトメジン-C(IGF-1)	ECLIA法	案内確認	案内確認	案内確認	ng/mL	2～3	10
285	クラミドフィラニューモニエIgA	クラミドフィラニューモニエIgA	ELISA法	陰性(-)8未満	陰性(-)8未満	陰性(-)8未満		3～5	14
286	クラミドフィラニューモニエIgG	クラミドフィラニューモニエIgG	ELISA法	陰性(-)30未満	陰性(-)30未満	陰性(-)30未満		3～5	22
287	クラミドフィラニューモニエIgM	クラミドフィラニューモニエIgM	ELISA法	陰性(-)0.5未満	陰性(-)0.5未満	陰性(-)0.5未満		3～5	44
288	アルドステロン:CLEIA	アルドステロン:CLEIA	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	随時173以下	随時173以下	随時173以下	pg/mL	2～3	341
289	25-OHビタミンD(くる病)	25-OHビタミンD(くる病)	ECLIA	案内確認	案内確認	案内確認	pg/mL	2～3	6
290	CAP16(食物アレルギー)	CAP16(食物アレルギー)	FEIA	0.35未満	0.35未満	0.35未満	UA/mL	2～3	67

番号	項目名称	項目名称(新)	検査法	基準値：男性	基準値：女性	基準値：不明	単位	所要日数	年間予定数量 (件)
291	CAP16(アトピー-乳幼児)	CAP16(アトピー-乳幼児)	FEIA	0.35未満	0.35未満	0.35未満	UA/mL	2~3	27
292	CAP16(アトピー-学童)	CAP16(アトピー-学童)	FEIA	0.35未満	0.35未満	0.35未満	UA/mL	2~3	11
293	CAP16(アトピー-成人)	CAP16(アトピー-成人)	FEIA	0.35未満	0.35未満	0.35未満	UA/mL	2~3	2
294	CAP16(花粉症・鼻炎)	CAP16(花粉症・鼻炎)	FEIA	0.35未満	0.35未満	0.35未満	UA/mL	2~3	57
295	CAP16(アレルギー-性ぜん息)	CAP16(アレルギー-性ぜん息)	FEIA	0.35未満	0.35未満	0.35未満	UA/mL	2~3	119
296	遊離L鎖κ／λ比(FLC)	遊離L鎖κ／λ比(FLC)	LA(ラテックス凝集比濁法)	案内確認	案内確認	案内確認		2~3	105
297	抗RNP抗体：CLEIA	抗RNP抗体：CLEIA	CLEIA	10.0 未満	10.0 未満	10.0 未満	U/mL	2~3	8
298	抗Sm抗体：CLEIA	抗Sm抗体：CLEIA	CLEIA	10.0 未満	10.0 未満	10.0 未満	U/mL	2~3	8
299	抗SS-A抗体：CLEIA	抗SS-A抗体：CLEIA	CLEIA	10.0 未満	10.0 未満	10.0 未満	U/mL	2~3	22
300	抗SS-B抗体：CLEIA	抗SS-B抗体：CLEIA	CLEIA	10.0 未満	10.0 未満	10.0 未満	U/mL	2~3	20
301	抗Scl-70抗体：CLEIA	抗Scl-70抗体：CLEIA	CLEIA	10.0 未満	10.0 未満	10.0 未満	U/mL	2~3	9
302	抗ミトコンドリアM2抗体	抗ミトコンドリアM2抗体	CLEIA	陰性(-)index7.0未満	陰性(-)index7.0未満	陰性(-)index7.0未満		2~3	16
303	オステオカルシン	オステオカルシン	FEIA	8.3—32.7	8.3—32.7	8.3—32.7	ng/mL	2~5	1
304	HTLV-I抗体：CLIA	HTLV-I抗体：CLIA	CLIA	陰性(-)1.00未満	陰性(-)1.00未満	陰性(-)1.00未満		2~3	2
305	抗サイログロブリン抗体	抗サイログロブリン抗体	CLIA	4.11 未満	4.11 未満	4.11 未満	IU/mL	2~3	11
306	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	CLIA	5.61 未満	5.61 未満	5.61 未満	IU/mL	2~3	12
307	検診風疹IgG：CLEIA	検診風疹IgG：CLEIA	CLEIA法	20 未満	20 未満	20 未満	IU/mL	2~5	13
308	蛋白分画	蛋白分画	キャピラリー電気泳動法	案内確認	案内確認	案内確認		2~3	380
309	CMV抗原(C7-HRP)	CMV抗原(C7-HRP)	直接免疫染色法	(-)	(-)	(-)		2~3	2
310	非結核性抗酸菌薬剤感受性試験	非結核性抗酸菌薬剤感受性試験	液体培地希釈法					14~21	5
311	抗酸菌同定(質量分析)	抗酸菌同定(質量分析)	質量分析法					2~5	8
312	UGT1A1遺伝子多型解析	UGT1A1遺伝子多型解析	インペーダー法					5~9	2
313	先天性Gバンド分染法	先天性Gバンド分染法	分染法					13~18	12
314	minor BCR-ABL1定量	minor BCR-ABL1定量	リアルタイム RT-PCR法	検出せず	検出せず	検出せず	コピー／μg RNA	4~10	1
315	Major BCR-ABL1 IS	Major BCR-ABL1 IS	リアルタイム RT-PCR法	検出せず	検出せず	検出せず		3~6	12
316	NUDT15遺伝子多型解析	NUDT15遺伝子多型解析	リアルタイムPCR法					5~11	2
317	JAK2V617F変異相対定量解析	JAK2V617F変異相対定量解析	アレル特異的定量的PCR(AS-qPCR)法	陰性(1.000%以下)	陰性(1.000%以下)	陰性(1.000%以下)		4~10	4
318	T-SPOT. TB	T-SPOT. TB	ELISPOT	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)		3~4	55
319	ALK融合タンパク(高感度IHC法)	ALK融合タンパク(高感度IHC法)	高感度免疫染色法(高感度IHC法)					5~8	1